

## Exkursion: Erwitte (Krs. Soest), NSG "Pöppelsche"

Leitung: GÖTZ H. LOOS, HANS JÜRGEN GEYER, Protokoll: CORINNE BUCH, Datum: 18.08.2012

Teilnehmer: GUIDO BOHN, GERHARD GOLAK, MICHAEL MAKALA, BERND MARGENBURG, STEFANIE VERCHAU-MAKALA, MONIKA ZYBORN-BIERMANN

Rosengewächse mit Stacheln und Dornen bereiten bekanntlich oft Bestimmungsprobleme. Auf dieser Exkursion ins östliche Haarstrang-Hellweggebiet mit seinen Plattenkalken wurden schwerpunktmäßig die hier artenreich vorhandenen Rosen und Weißdorne vorgestellt und dabei ihre Bestimmungsmerkmale genau erklärt.

*Ballota alba* (= *B. nigra* subsp. *meridionalis*) – Westliche Schwarznessel  
*Campanula rotundifolia* – Rundblättrige Glockenblume  
*Centaurea decipiens* × *jacea* – Nordwestliche Flockenblume  
*Chenopodium bonus-henricus* – Guter Heinrich  
*Cirsium acaule* – Stengellose Kratzdistel  
*Clinopodium vulgare* – Wirbeldost  
*Crataegus laevigata* – Zweigriffeliger Weißdorn  
*Crataegus monogyna* – Eingriffeliger Weißdorn  
*Crataegus* × *calycina* (= *C. lindmanii* × *laevigata*) – Hochkelchiger Weißdorn  
*Crataegus* × *domicensis* (= *C. lindmanii* × *monogyna*) – Leuchtdroter Weißdorn  
 Bislang sehr selten im mittleren Westfalen und Ruhrgebiet nachgewiesen  
*Crataegus* × *subsphaericea* (= *C. monogyna* × *rhypidophylla*) – Verschiedenzähniger Weißdorn  
 Hier in allen Übergängen zu *C. monogyna* vorhanden, aber auch intermediäre Typen  
*Euphrasia diekjobstii* (= *E. stricta* var. *parviflora*) – Kleinblütiger (Steifer) Augentrost  
*Mentha* × *gracilis* (= *M. spicata* bzw. *M. viridis* × *arvensis*) – Edel-Minze  
*Mentha viridis* (*M. spicata* s. l.) – Grüne Minze  
 Die Zuordnung des Typusnamens *M. spicata* ist unsicher, deshalb ist der sicher zutreffende Name *M. viridis* zu bevorzugen  
*Mentha* × *villosa* (= *M. spicata* × *suaveolens*) – Hain-Minze

*Odontites vulgaris* – Gewöhnlicher Zahntrost  
*Ononis* × *pseudohircina* (= *O. repens* × *spinosa*) – Bastard-Hauhechel  
*Ononis spinosa* s. str. – Dornige Hauhechel  
*Pimpinella saxifraga* – Kleine Bibernelle  
*Populus* × *canadensis* – Kanadische Pappel, K, S  
*Populus* × *canadensis* × *P. nigra*  
*Populus nigra* s. str. – Schwarz-Pappel i. e. S.  
*Rosa canina* – Hunds-Rose  
*Rosa corymbifera* – Hecken-Rose  
*Rosa micrantha* – Kleinblütige Rose  
*Rosa rubiginosa* – Wein-Rose  
*Rosa rubiginosa* × *schulzei*  
*Rosa schulzei* – Übergangs-Rose  
 Von einigen Autoren in den Sippenkreis von *R. agrestis* gestellt; Henker in der Hegi-Bearbeitung fasst hingegen *R. micrantha* sehr weit, sodass die hier vorkommenden Pflanzen danach auch zu dieser Art gestellt werden könnten. Ist jedenfalls Brückentyp zwischen *agrestis* und *micrantha*, der eigene, von den mutmaßlichen Eltern unabhängige Populationen aufbaut; bislang in NRW sehr selten nachgewiesen!  
*Rosa subcanina* – Mittelgebirgs-Heckenrose  
*Rosa subcanina* × *canina*  
*Scabiosa columbaria* – Tauben-Skabiose  
*Thymus praecox* agg.: *T. caespitosus* (= *T. praecox* subsp. *hesperites*) – Artengruppe Frühblühender Thymian



Abb. 1: Kleinblütige Rose (*Rosa micrantha*) (B. MARGENBURG).



Abb. 2: Übergangs-Rose (*Rosa schulzei*) (C. BUCH).